

8 Liên tục kiểm tra đất xung quanh khu vực cho ăn. Nếu đất có màu nâu hoặc ít nhất có một lớp mỏng màu nâu ngay trên bề mặt là được.

Tốt



Nếu đất có màu đen lên tận trên bề mặt thì cố gắng rải đều thức ăn xa bờ hơn (dùng thuyền nếu có thể), giảm bớt lượng thức ăn khoảng chừng 2 ngày và thay khoảng 15-20 cm nước.

Không tốt



9 Nếu là đất phèn hoặc nước có màu vàng thì bón vôi dọc theo bờ ao và tiếp tục bón vôi sau khi có mưa.



10 Trong điều kiện bình thường (không có tôm bệnh) thì sau khi cho tôm ăn khoảng 2 tiếng thu một vài mẫu tôm và kiểm tra xem ruột tôm có đầy không. Nếu ruột tôm không đầy thì bổ sung thêm lượng thức ăn.

Tốt



Do TS Pornlerd Chanratchakool & TS Flavio Corsin thực hiện. Với sự giúp đỡ của: Trần Quốc Thành (Sở Thủy sản Nghệ An) Trần Văn Liệu, Đặng Thu Hoàn (Sở Thủy sản Hà Tĩnh) và Phạm Văn Khang.

Soạn thảo cho người dân Nghệ An và Hà Tĩnh



Giảm Thiểu Rủi Ro
Bùng Phát Dịch Bệnh
Động Vật Thủy Sản

TỜ 3

10 bước để quản lý tốt ao nuôi tôm

(Bộ đầy đủ gồm 4 tờ)



THÁNG 5-2004

1 Đảm bảo rằng chênh lệch độ mặn giữa trại giống vào ao nuôi là thấp hơn 5 phần nghìn để tránh cho tôm giống bị sốc. Điều chỉnh độ mặn, nhiệt độ của nước trong bể ương tôm giống và của ao nuôi bằng cách: trước tiên thả các túi đựng tôm giống còn buộc kín xuống ao khoảng 15 - 30 phút, sau đó cứ 2 phút lại mở túi và cho nước từ từ vào bao. Sau đó từ từ nghiêng túi để tôm bơi ra.



2 Để tránh sốc cho tôm giống, giữ độ sâu mức nước trong ao nuôi hoặc trong ao ương hoặc trong trại ương ít nhất là 1 mét

3 Không sử dụng lại bất kỳ dụng cụ (lưới, thuyền, ...) đã được dùng trong ao khác vì chúng có thể mang mầm bệnh. Trong trường hợp phải dùng lại những dụng cụ đó thì phải đảm bảo các dụng cụ này đã được rửa sạch sẽ và phơi khô ít nhất 1 ngày. Ngoài ra nếu người nuôi đã xuống ao khác (đặc biệt là trong thời gian thu hoạch) thì phải tắm rửa sạch sẽ và không chạm vào tôm, thức ăn của tôm hoặc nước ao trong thời gian ít nhất 1 ngày.

4 Nếu nước ao có màu trong hoặc màu không tốt thì bổ sung thêm phân bón có hàm lượng photphat cao. Cứ 2-3 ngày bón 2-3 kg phân/ha cho tới khi nước ao đạt được màu theo yêu cầu.

Không tốt



Tốt



5 Nếu có tảo mọc ở đáy ao hoặc nổi trong ao thì phải lần lượt vớt bỏ hết.



6 Nếu nước ao có bọt hoặc nước ao đột nhiên trong thì thay khoảng 15-20 cm nước và bón vôi (200-300 kg bột đá/ha), bổ sung phân để gây màu.

Không tốt



7 Nếu nước ao có màu tối đen (xem hình dưới) thì không được sử dụng bất kỳ loại hoá chất nào để diệt tảo. Thay 15-20 cm nước nếu có thể. Nếu không thể thay nước thì không được dùng thức ăn tươi sống trong thời kỳ này.

Tối đen

