



Tôm đối

Tôm no



**6** Nếu tôm bệnh hoặc tôm chết có các đốm trắng trên vỏ (xem ảnh), **không tháo nước ao** và lập tức báo cho các chủ ao xung quanh.

Nếu bạn vẫn tìm thấy số tôm bệnh hoặc tôm chết ngày càng tăng trong hai ngày liên tiếp, **hãy thu hoạch tôm nhưng không tháo nước ao**. Nếu số tôm chết giảm đi và dừng hẳn trong vòng 10 ngày, bạn có thể bắt đầu tiến hành thay nước.

**7** Nếu bạn tìm thấy tôm bệnh hoặc tôm chết sau khi trời mưa và đất của bạn có chất phèn (axit), lập tức thêm vôi nung vào nước ao (100-200 kg vôi

nung/ha) và rắc vôi quanh bờ ao. Tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến ngư để đo độ pH và độ mặn xem có cần bổ sung vôi nữa không. (Tốt nhất nên bón vôi xung quanh bờ ao trước khi mưa).

**8** Không chuyển tôm từ ao bị bệnh hoặc ao và nguồn nước có dấu hiệu tôm chết sang ao khác.

**9** Nếu bạn thấy tôm bơi quanh bờ ao **vào buổi sáng sớm**, lập tức thay 15-20 cm nước và giảm lượng thức ăn, tăng cường quạt nước nếu có.



**10** Nếu bạn thấy tôm bệnh hoặc tôm chết trong quá trình nuôi, hãy đọc kỹ trọn bộ tờ rơi "10 bước chuẩn bị ao nuôi tôm", "10 bước chuẩn bị thả tôm và chọn giống tốt"; "10 bước để quản lý tốt ao nuôi tôm" và "10 bước để quản lý tốt sức khỏe của tôm" để đề phòng các vấn đề về sức khỏe đối với tôm trong vụ nuôi tiếp theo.

Do TS Pornlerd Chanratchakool, TS Flavio Corsin và TS Matt Briggs thực hiện. Xin chân thành cảm ơn GS. Timothy Flegel đã cung cấp nhiều hình ảnh sử dụng trong tài liệu này. Với sự giúp đỡ của: Trần Quốc Thành (Sở Thủy sản Nghệ An), Trần Văn Liệu, Đặng Thu Hoàn (Sở Thủy sản Hà Tĩnh) và Phạm Văn Khang Soạn thảo cho người dân Nghệ An và Hà Tĩnh



**Giảm Thiểu Rủi Ro  
Bùng Phát Dịch Bệnh  
Động Vật Thủy Sản**

## TỜ 4

(Bộ đầy đủ gồm 4 tờ)

# 10 bước quản lý tốt sức khỏe của tôm



THÁNG 5-2004

**1** **Hàng ngày** liên tục ghi chép số lượng và biểu hiện của tôm bệnh hoặc tôm chết ở gần bờ, vớt số tôm này ra khỏi ao và chôn chúng ở nơi xa hẳn các ao khác.



**2** Hàng tuần dùng khay hoặc chài để lấy 10 con tôm làm mẫu và kiểm tra xem vỏ hoặc mang của tôm có bị bẩn không.

Nếu có, rắc thức ăn ra xa các chỗ trũng hơn, dùng mắt lưới nhỏ vớt tảo ở đáy ao hoặc tảo nổi trên mặt nước và thay 15-20 cm nước rồi dùng bột đá (200-300 kg  $\text{CaCO}_3$ /ha).

Sàng kiểm tra thức ăn



Tôm bị bẩn vỏ



Tôm bị bẩn mang



**3** Nếu không có tôm bệnh và sau khi thả tôm giống được 3-4 tuần mà bạn vẫn thấy tôm bơi quanh bờ ao, kiểm tra lớp đất ở đáy ao xem có màu đen tối hoặc có tảo không. Nếu có, vớt tảo từ đáy ao, giảm lượng thức ăn và thay 15-20 cm nước rồi dùng bột đá (200-300 kg  $\text{CaCO}_3$  /ha). Nếu đất đáy ao bình thường, tăng thêm một ít thức ăn.

Đất có màu đen



Đất thường



**4** Nếu thấy tôm có phân trắng hoặc có tôm bệnh hay tôm chết ở bờ ao, kiểm tra xem vỏ hoặc mang tôm có bẩn không (xem các ảnh trong Bước 2). Nếu có, không dùng thuốc để xử lý. Giảm lượng thức ăn, thay 15-20 cm nước và sau đó dùng bột đá (200-300 kg  $\text{CaCO}_3$  /ha).

**5** Nếu bước thứ 4 không giúp cải thiện tình hình, và bạn tìm thấy nhiều tôm bệnh hoặc tôm chết hơn trong hai ngày liên tiếp, hãy dùng vợt sạch và khô để lấy mẫu tôm và, nếu hơn 50% tôm không ăn, xem xét việc thu hoạch.